



猪场洗消应用表

项目		使用产品	稀释比例	作用时间	操作说明	备注	
清洗	车辆清洗	洗百健(泡沫清洗剂)	1:100	不低于20分钟	高压发泡均匀喷淋	高压冲洗后沥干或烘干	
		康卫宝(泡沫清洗剂)					
	猪栏清洗	洗百健(泡沫清洗剂)	1:100	不低于20分钟	高压发泡均匀喷淋	高压冲洗后沥干或烘干	
		康卫宝(泡沫清洗剂)					
消毒	车辆消毒	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:100	快速消杀	高压喷淋	车辆消毒原则上要求静置30分钟, 如有需快速通行的, 执行消毒速消1:100	
			1:200	20-30分钟			
	车辆驾驶室消毒	欣多克(二氧化氯消毒片)	1粒/100kg水	20分钟	雾化机打入驾驶室	车辆驾驶室密封	
		科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)	1:200				
	车辆消毒池	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:100	车辆缓缓通过		日常3-5天更换一次; 车次多时需定时测定消毒剂有效杀菌浓度并及时更换	
		烧碱	1:20(5%)				
	人员消毒通道	欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水	2分钟	雾化机雾化消毒		
		科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)	1:200				
		新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:200	2分钟	脚垫浸泡		3天保洁一次
	猪舍门口消毒	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:100	快速消杀	穿鞋浸泡	3天保洁一次	
	人员洗手、洗澡	欣多克(二氧化氯片)	洗手、洗澡: 1粒/100kg水			浸泡淋浴	
			安福康(聚维酮碘溶液)				洗手1:20
							洗澡1:50
	物资消毒	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:300	20分钟	表面喷雾消毒	消毒后去除外包装进场; 可储存的干物资放消毒间进行紫外线臭氧消毒, 防止消毒死角	
		欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水				
	蔬菜食品消毒	欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水	1分钟	浸泡		
工作服消毒	安福康(聚维酮碘溶液)	1:20	30分钟	浸泡消毒后清洗			
	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:200					
工具消毒	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:200	30分钟	浸泡	猪场里的电器类不可浸泡消毒的设备可在消毒间进行紫外线臭氧消毒		
办公、食堂生活场所消毒	欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水		喷雾消毒或拖地板	食堂厨余需做好防虫害消毒工作		
	科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)	1:200					
	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:300					



项目	使用产品	稀释	作用时间	操作说明	备注	
消毒	带猪消毒	欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水		从高到低 喷雾消毒	新安洁1: 500可作为 带猪消毒剂冲洗猪舍 地面
		科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)	1:200			
		新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:300			
	空栏消毒	科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)	1:200		从高到低 喷雾消毒	使用过程中注意 安全卫生防护
		新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:200			
		烧碱	5%			
		过氧乙酸	1%			
		复合酚	2%			
	水质消毒	欣多克(二氧化氯片)	饮用水: 1粒/1-2吨水 生产用水: 10粒/吨水	每周 2次	均匀 泼洒	暴雨过后必须消毒
		漂白粉	50g/吨水			
	场地消毒	新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)	1:200	每周 2-3次	均匀 喷洒	下雨天不建议使用生 石灰;使用烧碱时注意 安全; 复合酚气味较重,不建 议靠近居民区使用。
		烧碱	5%			
		复合酚	2%			
		生石灰	原粉			
	空气消毒	欣多克(二氧化氯片)	1粒/100kg水	带猪密封 30分钟; 空栏空气 消毒密封 2个小时以 上	雾化消毒 (过氧乙 酸、醋酸 必须使用 防腐蚀器 械雾化)	过氧乙酸、醋酸 不可带猪消毒
科谷全能(过硫酸氢钾复合物粉)		1:200				
新安洁(戊二醛癸甲溴铵溶液)		1:300				
过氧乙酸		1:100				
醋酸		1:20				
虫害	蚊子	苏云金干菌 (以色列亚种)	1L: 50L稀释 50-75ml稀释液/平方米	每隔7- 15天喷洒 一次	水塘、粪 便池投放	
		美瑞高 (天然精油)	200g-500g/吨料	全程 饲料添加		防止蚊子叮咬
	苍蝇	水溶型法茛驱蝇(1%环丙氨嗪)	1.5kg/吨饲料	长期添加	饲料添加	猪场外围飞行成蝇可 用农药驱杀

说明: 使用消毒剂必须认真鉴别消毒剂的化学性质, 避免酸碱不同类型的消毒剂同时使用; 使用刺激性大的消毒剂时, 消毒人员与机械看护人员必须同时进行。